

## POMADA DE UREA AL 15 % Y ÁCIDO SALICÍLICO AL 5 %

<b>Urea</b>	<b>15 g</b>
<b>Acido salicílico</b>	<b>5 g</b>
<b>Agua destilada</b>	<b>17 g</b>
<b>Lanolina anhidra</b>	<b>15 g</b>
<b>Vaselina líquida</b>	<b>5 g</b>
<b>Vaselina filante csp</b>	<b>100 g</b>

### *Forma de elaboración*

---

En un baño de agua regulado a 50-60° C de temperatura se calienta el agua destilada y se disuelve la urea. Una vez disuelta, se saca del baño la solución obtenida y se deja enfriar a temperatura ambiente. Por otro lado, se mezclan en un mortero la lanolina y vaselina calentadas previamente a 30° C batiendo hasta enfriamiento. Se añade la solución anterior de urea en porciones de 1-2 ml batiendo hasta homogeneidad tras cada adición. En otro mortero, se reduce a polvo fino el ácido salicílico, se añade la vaselina líquida y se bate hasta formar una pasta homogénea. Se añade la pomada anterior en pequeñas porciones batiendo hasta homogeneidad.

### *Caracteres físicos y organolépticos*

---

Pomada ligeramente amarillenta con ligero olor céreo, con alta oclusividad y consistencia, y moderada extensibilidad.

### *Envasado y caducidad teórica*

---

Envasar en tubo de aluminio esmaltado o de plástico (polietileno) de baja presión. Caducidad de 1 mes.

### *Conservación*

---

Proteger de la luz, en envase bien cerrado, fuera de la humedad y a temperatura inferior a 25° C.

### *Acción dermatológica*

---

La acción altamente queratolítica del ácido salicílico queda reforzada por la de la urea. El excipiente potencia la acción queratolítica debido a su oclusividad.

### *Indicaciones y posología*

---

Psoriasis (mantenimiento terapia corticoides) y eczemas con alta cronicidad. Aplicar cada 12 horas.

### *Forma de administración*

---

Administrar en moderada capa sobre la zona afectada dando un suave masaje. Se recomienda cubrir con plástico (cura oclusiva) en procesos altamente crónicos.

### *Efectos adversos*

---

Puede producir un ligero picor y escozor transitorio tras la aplicación.

### *Formas de prescribir esta fórmula por parte del médico*

---

<b>Urea</b>	<b>15 %</b>
<b>Acido salicílico</b>	<b>5 %</b>
<b>Vaselina filante csp</b>	<b>100 g</b>

<b>Urea</b>	<b>15 %</b>
<b>Acido salicílico</b>	<b>5 %</b>
<b>Pomada de vaselina csp</b>	<b>100 g</b>

<b>Urea</b>	<b>15 %</b>
<b>Acido salicílico</b>	<b>5 %</b>
<b>Pomada de vaselina y lanolina csp</b>	<b>100 g</b>